

POTRATOVOST

Regionální rozložení indukované potratovosti (uvažují se umělá přerušení těhotenství) na úrovni krajů se podobně jako rozvodovost a podíl dětí narozených mimo manželství vyznačuje poměrně vysokou variabilitou. Výše úhrnné indukované potratovosti (průměrný počet interrupcí připadajících na jednu ženu ve věku 15-49 let) se v roce 2005 pohybovala v jednotlivých krajích mezi 0,25 (Zlínský a Pardubický kraj) a 0,48 interrupce (Ústecký a Karlovarský kraj). V celkovém pohledu je tak patrný rozdíl mezi severozápadními Čechami s vysokou intenzitou potratovosti a východní částí republiky s její nižší intenzitou (s výjimkou Moravskoslezského kraje, kde její úroveň odpovídá republikovému průměru). Jedná se tedy opět o základní rozložení obdobné rozložení podle výše rozvodovosti a podílu dětí narozených nevdaným ženám.

Podstatné je, že intenzita indukované potratovosti se od počátku devadesátých let výrazně snížila ve všech krajích republiky. Před zhruba patnácti lety připadala v jednotlivých regionech na jednu ženu jedna interrupce či více, zatímco současné maximum je nejméně o polovinu nižší. Rovněž mezi roky 2004 a 2005 došlo ke snížení, s výjimkou Královéhradeckého kraje, kdy hodnota úhrnné indukované potratovosti byla v loňském roce v zásadě totožná s hodnotou za předchozí rok.

Tab. 6 Indukovaná potratovost a podíl žen užívajících antikoncepci předepsanou lékařem, 2005 (2004)

Kraj	Úhrnná indukovaná potratovost*		Průměrný věk žen při interrupci		Podíl žen ve fertilním věku užívajících antikoncepci předepsanou lékařem (%)**	
	hodnota 2005	vývoj mezi roky 2004 a 2005	hodnota 2005	vývoj mezi roky 2004 a 2005	hodnota 2004	vývoj mezi roky 2003 a 2004
Hlavní město Praha	0,39	↓	29,8	↓	69,1	↑
Středočeský	0,37	↓	29,7	↓	44,7	↑
Jihočeský	0,34	↓	30,1	↓	50,5	↑
Plzeňský	0,41	↓	29,8	↓	41,5	↑
Karlovarský	0,48	↓	28,8	↓	50,2	↑
Ústecký	0,48	↓	28,7	↓	50,9	↑
Liberecký	0,42	↓	29,3	↓	46,1	↑
Královéhradecký	0,40	↑	29,5	↓	50,2	↑
Pardubický	0,25	↓	30,5	↑	48,4	↑
Vysočina	0,28	↓	30,2	↑	42,7	↑
Jihomoravský	0,30	↓	30,0	↓	50,2	↑
Olomoucký	0,29	↓	30,3	↑	58,1	↑
Zlínský	0,25	↓	30,2	↓	44,3	↑
Moravskoslezský	0,34	↓	29,3	↑	47,1	↑
Česká republika	0,35	↓	29,6	↓	50,5	↑

* průměrný počet umělých přerušení těhotenství (interrupcí) připadajících na jednu ženu ve věku 15-49 let za předpokladu zachování měr indukované potratovosti podle věku z roku 2005

** údaj ÚZIS; v době přípravy publikace data za rok 2005 nebyla k dispozici

Nejvyšším podílem žen ve fertilním věku užívajících antikoncepci předepsanou lékařem (hormonální a nitroděložní) se jednoznačně vyznačuje Praha, kde téměř sedmdesát procent žen ve věku 15-49 let používá jeden z typů tohoto druhu antikoncepce, a mezi roky 2003 a 2004 zde byl také zaznamenán nejvyšší nárůst tohoto podílu (následoval Středočeský kraj). Naopak nejnižší procento žen užívajících moderní antikoncepční prostředky je v Plzeňském kraji. Neukazuje se však významná korelace mezi tímto podílem a celkovou úrovní indukované potratovosti. V některých krajích s nízkou úrovní indukované potratovosti je podíl žen užívajících antikoncepci předepsanou lékařem naopak podprůměrný (Zlínský či Vysočina) – zřejmě v souvislosti s vazbou na vyšší religiozitu těchto regionů.

Obr. 10 Úhrnná indukovaná potratovost v krajích, 2005

